

L'avifaune du "Thier des Carrières" à Vielsalm



par Bernard CLESSE

Secrétaire général-adjoint des Cercles des Naturalistes de Belgique a.s.b.l.

Adresse de contact : Centre Marie-Victorin, Rue des Écoles 21 à 5670, Vierves-sur-Viroin.

E-mail : bclesse_cnb@yahoo.fr



Grand duc d'Europe

photo: Damien Hubaut (C.N.B)

Outre l'intérêt exceptionnel de son patrimoine fongique et botanique (lichens, champignons, bryophytes, ptéridophytes et spermatophytes), de son patrimoine géologique et minéralogique, de son passé industriel et de ses aspects paysagers, le "Thier des Carrières" à Cahay (Vielsalm) constitue également un site ornithologique de grand intérêt pour cette région ardennaise.

Le "Bec du Corbeau" et le défilé de la "Fosse Roulette" entre Vielsalm et Salmchâteau sont la suite logique du "Thier des Carrières" en direction de l'ouest et du sud-ouest. Le passé ornithologique de ce site laisse rêveur puisque le **monticole ou merle de roche** (*Monticola saxatilis*), espèce éteinte depuis longtemps en Belgique, y était nicheur au 19ème siècle. **Le faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) y a encore niché jusqu'en 1954 tandis que le nom de "Bec du Corbeau" laisse imaginer la présence ancienne du **grand corbeau** (*Corvus corax*), hôte des milieux rupestres notamment. Une des anciennes fosses se dénommait Ardoisière du Corbeau.

Entre 1980 et 2005, pas moins de 56 espèces ont été recensées au "Thier des Carrières" parmi lesquelles quelques espèces nicheuses remarquables : **gélinotte des bois, grand-duc d'Europe, sizerin flammé, pic noir, rouge-queue à front blanc, casse-noix moucheté, etc.**

La raison de cette variété d'espèces réside dans la grande diversité de milieux : falaises rocheuses et

anciennes fosses d'exploitation à ciel ouvert, éboulis rocheux et terils de déchets d'ardoises envahis par la boulaie, la boulaie de recolonisation (faisant suite à l'incendie de 1976), la chênaie-boulaie à myrtille, les vieilles pessières et plantations de résineux, les lambeaux de landes à callune, les coupes à blanc, etc.

En ce qui concerne les espèces nicheuses, il est bon de distinguer (a) les espèces qui nichent assurément sur le site (nicheur local = N local) et (b) les espèces qui le fréquentent uniquement lors de la recherche de nourriture et nichent (nicheurs certains ou potentiels) en-dehors de la zone (= N proche). On retrouve

dans ce cas de figure les espèces anthropophiles comme le moineau domestique, la tourterelle turque, les hirondelles et le martinet noir dont la présence s'explique par la contiguïté du site avec la bourgade de Vielsalm et plus particulièrement le lotissement de Cahay (elles peuvent donc n'exploiter parfois que l'espace aérien du site) mais aussi des espèces à territoire vaste tels que la bécasse des bois, l'autour des palombes, le milan royal, la bondrée apivore, le pic noir, etc.

Enfin, d'autres espèces n'y ont été observées qu'en halte migratoire et ne sont donc pas nicheuses (= NN) sur le site ou à sa proximité.



Rougequeue à front blanc mâle
photo: Damien Hubaut (C.N.B)

Liste des espèces observées au "Thier des
Carrières" entre 1980 et 2005 :

- accenteur mouchet (*Prunella modularis*)
N local
- autour des palombes (*Accipiter gentilis*)
N proche
- bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)
N proche
- bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
NN
- bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)
N proche
- bergeronnette grise (*Motacilla alba*)
N local
- bondrée apivore (*Pernis apivorus*)
N proche
- bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)
N local
- bruant jaune (*Emberiza citrinella*)
N local
- busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)
NN
- chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)
N local
- corneille noire (*Corvus corone*)
N local
- coucou gris (*Cuculus canorus*)
N local
- épervier d'Europe (*Accipiter nisus*)
N local
- faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)
N local
- fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)
N local
- fauvette des jardins (*Sylvia borin*)
N local
- fauvette grisette (*Sylvia communis*)
N local
- geai des chênes (*Garrulus glandarius*)
N local
- gélिनotte des bois (*Bonasa bonasia*)
N proche
- gobe-mouche noir (*Ficedula hypoleuca*)
NN
- grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)
N local

- grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)
N local
- grive draine (*Turdus viscivorus*)
N local
- grive litorne (*Turdus pilaris*)
N local
- grive musicienne (*Turdus philomelos*)
N local
- hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)
N proche
- hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)
N proche
- linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)
N local
- martinet noir (*Apus apus*)
N proche
- merle noir (*Turdus merula*)
N local
- mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)
N local
- mésange bleue (*Parus caeruleus*)
N local
- mésange boréale (*Parus montanus*)
N local
- mésange charbonnière (*Parus major*)
N local
- mésange noire (*Parus ater*)
N local
- milan royal (*Milvus milvus*)
N proche
- moineau domestique (*Passer domesticus*)
N proche
- pigeon ramier (*Columba palumbus*)
N local
- pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)
N local
- pipit des arbres (*Anthus trivialis*)
N local
- pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)
N local
- pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)
N local
- pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)
N local

- roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*)
N local
- roitelet huppé (*Regulus regulus*)
N local
- rouge-gorge familier (*Erithacus rubecula*)
N local
- rouge-queue à front blanc
(*Phoenicurus phoenicurus*)
N local
- rouge-queue noir (*Phoenicurus ochruros*)
N local
- sizerin flammé cabaret
(*Carduelis flammea cabaret*)
N local
- tarier des prés (*Saxicola rubetra*)
NN
- tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)
N local
- tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)
N local
- tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)
N proche
- troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)
N local
- verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)
N local

C'est évidemment pour les espèces nicheuses que le site revêt son intérêt primordial.

L'espèce emblématique du site est, sans conteste, le **grand-duc d'Europe** ! Sa présence y est au moins attestée depuis le 24/10/1991. Bien que nous n'ayons pas de preuve de sa présence continue jusqu'en 2005, on peut être en mesure de le supposer car l'oiseau choisit des endroits discrets et quasi inaccessibles (falaises rocheuses dominant les anciennes fosses, hauts épicéas de lisière...) qui le mettent ainsi à l'abri des dérangements. L'oiseau a été entendu ou observé en 1991, 1994, 2000 et 2004. Le grand-duc est vraisemblablement suivi sur le site par des ornithologues spécialisés mais ceux-ci ne communiquent généralement pas leurs données afin de garantir sa quiétude.

Autre espèce prestigieuse, très rare en Belgique : la **gélinotte des bois** ! Deux exemplaires ont été observés dans un taillis de bouleaux en mars 1992. Cette espèce ardennaise est quasi mythique, tant il est difficile de l'observer.

Espèce nicheuse fort rare en Belgique et uniquement localisée sur les hauts plateaux ardennais, le **sizerin**



Tarin des aulnes mâle et Tarin des aulnes femelle
photo: Damien Hubaut (C.N.B)

flammé cabaret est un habitué des massifs denses de bouleaux dont il consomme notamment les semences en automne-hiver. Sa présence en période de nidification est au moins certaine depuis 1983. On le retrouve dans des sites proches comme la réserve naturelle C.N.B. des "Quatre-Vents" ainsi que dans les landes tourbeuses du plateau des Tailles.

La présence, au "Thier des Carrières", du **rougequeue à front blanc**, espèce habituelle des vergers, parcs arborés et forêts feuillues claires surprend un peu. Il semblerait retrouver ici un habitat originel, à savoir les milieux rupestres avec cavités, ce que rappellerait son ancien nom de "rossignol des murailles". Plusieurs couples nichent au "Thier des Carrières", au niveau des anciennes fosses d'exploitation et des terrils contigus. **Le rougequeue noir**, hôte commun des villes et villages a conservé dans nombre de régions montagneuses d'Europe, une prédilection pour les milieux rupestres ; c'est par opportunisme qu'il a délibérément "abandonné" ces milieux naturels pour des milieux anthropiques (plus sécurisants ?). Quelques couples nichent régulièrement au "Thier des Carrières". Parmi les espèces affectionnant particulièrement les milieux rupestres, on peut encore citer ici le **faucon crécerelle**, dont les fientes sont visibles en plusieurs endroits en haut des falaises dominant les fosses, et le **troglodyte mignon** qui trouve dans les éboulis ombragés et moussus les endroits rêvés pour l'installation de ses multiples nids.

Le **tarin des aulnes** et le **bec-croisé des sapins** nichent couramment dans les mêmes milieux, à savoir les vieilles pessières. Très courantes dans la région, ces vieilles pessières, présentes notamment à l'ouest du site (en direction du "Bec du Corbeau"), sont plus courantes en périphérie sud et est du "Thier des Carrières". Les populations de ces deux espèces fluctuent très fort d'année en année ; les maxima étant enregistrés dans les années qui suivent les invasions. Dans nos régions, certaines espèces d'oiseaux comme e.g. le bec-croisé des sapins, le cassenoix moucheté de Sibérie, le sizerin flammé, le jaseur boréal et le tarin des aulnes, sont sujettes à invasions essentiellement en provenance du nord de l'Europe et de Sibérie. Ces invasions sont un peu comparables à des migrations sans retour, motivées

par une surpopulation de l'espèce et une carence en nourriture dans le pays d'origine. Des déplacements massifs de populations peuvent alors avoir lieu vers des destinations de "secours" où les oiseaux pourront trouver, le cas échéant, de quoi survivre. Dans certains cas, des oiseaux peuvent s'installer durablement dans le pays d'accueil, ce qui est le cas, bien connu, du cassenoix moucheté de Sibérie qui niche depuis 1975 dans la région de Stavelot puis un peu partout en haute Ardenne, suite à une invasion massive qui avait eu lieu en 1968 en Belgique.

Les oiseaux nicheurs du site peuvent être classés en fonction de leurs milieux de prédilection :

- a) anciennes fosses d'exploitation, falaises rocheuses et cônes d'éboulis en contrebas : grand-duc d'Europe, faucon crécerelle, rougequeue noir et à front blanc, bergeronnette grise, troglodyte mignon...
- b) massifs de bouleaux répartis en bordure sud des anciennes fosses mais aussi sur les anciens terrils et un peu partout en périphérie : fauvettes à tête noire et des jardins, pouillots véloce et fitis, sizerin flammé, tarin des aulnes, grives litorne et musicienne, mésanges bleue, charbonnière et boréale, chardonneret élégant, tourterelle des bois, rougegorge familier, coucou gris, pipit des arbres...
- c) pessières âgées et d'âge moyen : pigeon ramier, corneille noire, autour des palombes, épervier d'Europe, bec-croisé des sapins, tarin des aulnes, pic noir, cassenoix moucheté, mésanges noire et huppée, roitelets huppé et à triple bandeau, grive draine, pinson des arbres, tourterelle des bois...
- d) jeunes pessières : mésanges noire et huppée, bruant jaune, accenteur mouchet, rougegorge familier, merle noir, grive musicienne, bouvreuil pivoine, mésange à longue queue, coucou gris, pinson des arbres, linotte mélodieuse, verdier d'Europe, pipit des arbres, fauvette grisette...

e) vieille chênaie-boulaie : pouillot siffleur, grimpeur des jardins, grive draine, pigeon ramier, geai des chênes, rougegorge familier...

On comprend aisément, à la lecture des paragraphes précédents, que le "Thier des Carrières" figure en bonne position parmi les sites semi-naturels remarquables de cette région ardennaise voire de la Belgique et ce, sans exagération, compte-tenu de ses autres intérêts patrimoniaux. On ne peut qu'espérer que le statut de réserve naturelle domaniale pour une bonne partie du site soit le meilleur garant de sa pérennité.

Bibliographie

Clesse, Bernard, 1984. Promenade au Thier des Carrières de Vielsalm. Mémoire inédit présenté pour l'obtention du brevet de guide-nature.

Clesse, Bernard, 1988. Oiseaux du Pays de Salm. Mémoire n°1. Vierves-sur-Viroin. Cercles des Naturalistes de Belgique, 322 p.

Clesse, Bernard, 1994-2004. Chroniques ornithologiques de la Trientale, d'avril 1994 à décembre 2004, publiées dans le cadre des activités de la section "La Trientale" des Cercles des Naturalistes de Belgique.

de la Fontaine, A., 1865. Faune du Pays de Luxembourg. Oiseaux. Rapport à la Société des Sciences naturelles de Luxembourg.



Troglodyte mignon

photo: Damien Hubaut (C.N.B)